

# АИВ МЕНЕН ЖАШАГАН ЭНЕЛЕР ҮЧҮН БАЛДАРДЫ ЭМИЗҮҮ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР

## БАЛДАРДЫН АИВ-ПОЗИТИВДҮҮ ЭНЕЛЕРДЕН ЖУКТУРУП АЛЫШЫ

АИВ-ПОЗИТИВДҮҮ ЭНЕЛЕРДЕН БАЛДАРГА ЖУГУШУ МҮМКҮН:	ЭГЕРДЕ АИВ-ПОЗИТИВДҮҮ ЭНЕЛЕР АРВ-ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫН ИЧИШПЕСЕ	ЭГЕРДЕ АИВ-ПОЗИТИВДҮҮ ЭНЕЛЕР АРВ-ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫН ИЧИШСЕ
КОШ БОЙЛУУ УЧУРДА	➤ 100 БАЛАНЫН ИЧИНЕН 5 БАЛАГА ЖУГАТ	➤ 100 БАЛАНЫН ИЧИНЕН 1 БАЛАГА ЖУГАТ
ТӨРӨТ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ УЧУРУНДА ЖАНА ТӨРӨТТӨ	➤ 100 БАЛАНЫН ИЧИНЕН 15 БАЛАГА ЖУГАТ	➤ 100 БАЛАНЫН ИЧИНЕН 1 БАЛАГА ЖУГАТ
ЭМЧЕК ЭМИЗҮҮ УЧУРУНДА	➤ 100 БАЛАНЫН ИЧИНЕН 15 БАЛАГА ЖУГАТ	➤ 100 БАЛАНЫН ИЧИНЕН 3 БАЛАГА ЖУГАТ

### АИВ-ПОЗИТИВДҮҮ ЭНЕЛЕР ҮЧҮН БАЛДАРДЫ ЭМИЗҮҮ БОЮНЧА СУНУШТАР:

- ✓ Энелерге эмчек эмизгенден баш тартып жасалма багуу сунушталат.
- ✓ Эгерде Сиз жана Сиздин балаңыз үчүн тамактандыруу ылайыктуу, сатып алууга мүмкүн, жеткиликтүү, туруктуу жана коопсуз болуп саналбаса, баланын өмүрүнүн биринчи 6 айынын ичинде эмчек сүтү менен гана багуу сунушталат.
- ✓ Жасалма багуу, ылайыктуу, сатып алууга мүмкүн, жеткиликтүү, туруктуу жана коопсуз болуп калганда, АИВ-позитивдүү энелерге эмчек эмизүүдөн баш тартуу сунушталат.
- ✓ Аралаш багууга, б.а. балага эмчек сүтүнө кошумча кайсы гана болбосун тамак-аш жана суюктуктарды берүүгө жол берилбейт.
- ✓ Аралаш тамактандыруу энеден балага АИВ жугуу коркунучун жогорулатат.